

silicolgel

koloidna silicijeva kiselina za probavne poremećaje

za liječenje

- Žgaravice
- Refluksa
- Povraćanja

i simptoma iritabilnog crijeva (IBS)

- Mučnine
- Nadutosti
- Bolova u trbuhu
- Nelagode
- Proljeva

silicolgel sadrži silicijevu kiselinu, koja je spoj mineralne tvari silicija i kisika u koloidnom (visoko dispergiranom) i hidratiziranom obliku.

Silicij je drugi najzastupljeniji element na Zemlji, nakon kisika. Nalazi se u prirodi kao silicijev dioksid te u hidratiziranom obliku ili u obliku vodene otopine, kao silicijeva kiselina.

Poremećaji probavnog sustava najčešće su uzrokovani iritansima te štetnim i toksičnim tvarima, kao i patogenima. Probavni sustav je posebno važan za zdravlje organizma. Tijelo može biti opskrbljeno s dovoljno hranjivih tvari samo kada je zdravo. Kada je probavni sustav opterećen toksičnim tvarima i patogenima, može doći do poremećaja kao što su žgaravica, refluks i povraćanje te mučnina, bolovi u trbuhu, nelagoda, proljev i nadutost koji mogu biti simptomi sindroma iritabilnog crijeva (IBS). Kao rezultat toga, probavni sustav ne može normalno funkcionirati, što može dovesti do tjelesne nelagode.

Prednost silicolgela je velika i vrlo reaktivna površina silicijeve kiseline. Kada se uzima oralno, stvara zaštitni i smirujući sloj na sluznici želuca i crijeva. Zbog svog apsorpcijskog ili vezujućeg svojstva koloidna silicijeva kiselina fizički adsorbira ili veže većinu iritansa, štetnih i toksičnih tvari te patogena. Time ih čini bezopasnima jer mogu biti uklonjeni iz organizma putem crijeva. Silicijeva kiselina također može vezati plinove, smanjiti višak kiseline i nadutost.

UPUTA ZA UPORABU:

- Protresite bocu prije svake uporabe.
- Uzmite silicolgel najmanje jedan sat prije ili nakon uzimanja lijekova.

Za liječenje probavnih poremećaja, uzeti 1 žlicu (15 ml) silicolgela tri puta dnevno, po mogućnosti prije obroka.

Djeca do 12 godina starosti mogu koristiti silicolgel samo po preporuci liječnika.

silicolgel se može uzeti nerazrijeđen ili razrijeđen s vodom. Nakon ublažavanja akutnih simptoma, liječenje silicolgelom se može nastaviti još nekoliko dana.

silicolgel također ublažava slične simptome u probavnom sustavu koji mogu nastati zbog promjena u prehrani tijekom putovanja ili na odmoru.

Ako se akutni simptomi nisu smanjili nakon tri dana, obratite se liječniku.

U slučaju proljeva, potrebno je nadomjestiti izgublenu tekućinu. Kod kroničnih bolesti, liječenje i do 4 tjedna.

silicolgel je pogodan za vegetarijance i vegane. Bez glutena.

SASTAV:

3,5 g silicijevog dioksida u 100 ml gela silicijeve kiseline,

Konzervansi: sorbatna kiselina (E 200), natrijev benzoat (E 211).

NUSPOJAVE:

Nema poznatih nuspojava.

INTERAKCIJE:

silicolgel treba uzeti najmanje 1 sat prije ili nakon uzimanja lijekova.

KONTRAINDIKACIJE:

Ne koristite silicolgel u slučaju preosjetljivosti na bilo koji od sastojaka.

VAŽNO:

- Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.
- Ne zamrzavati. Čuvati na temperaturi od 2°C - 25°C.
- Protresite bocu prije svake uporabe.
- Pročitajte uputu prije uporabe.
- Koristite samo do roka valjanosti navedenog na pakiranju.
- Nakon prvog otvaranja koristite najdulje 3 mjeseca.

Vrsta proizvoda: gel za oralnu uporabu

SADRŽAJ:

Boca sa 200 ili 500 ml.

Uputa je zadnji puta revidirana u rujnu 2015.

Certificiran medicinski proizvod.

PROIZVOĐAČ: Saguna GmbH, Teltower Strasse 10, D-33719 Bielefeld, Njemačka

DISTRIBUTER ZA RH

SALVEO d.o.o., Zavrtnica 17, Zagreb